

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТІЛЬКИ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ  
МЕДИЧНИМ ЛІКАРЕМ АБО ЛІКАРНЕЮ, АБО ЛАБОРАТОРІЄЮ

**ALARSIN**

www.alarsin.com

## ФОРТЕЖ, ПРИРОДНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОШИРЕНИХ СЕКСУАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У ЧОЛОВІКІВ

Доктор Н. С. Бхаргава, головний венеролог  
Центру захворювань, які передаються статевим  
способом, лікарні Сафдлзарджанг, м.Нью-Делі.  
Доктор О. П. Сінгх, Клініка психо-сексуальних  
розладів, Всеіндійський інститут медичних  
наук, м. Нью-Делі.

### ВСТУП:

На сьогодні про збільшення випадків чоловічих сексуальних розладів повідомляється по всьому світу. Стрес, напруга та втому, зумовлені сучасними умовами життя багато в чому є причинами такого явища. Втома, як головна причина, обговорювалися на Третньому Міжнародному Конгресі Психосоматичної медицини в Парижі. Втома зумовлює гіпотонію і послаблення травної системи. Втома це не звичайна слабкість, що відчувається після певного навантаження, втома це одна з форм слабкості, яка врешті може призвести до функціональної імпотенції. Після спортивних тренувань можливо розслабитися та відчувати себе свіжим та енергійним, тоді як під час втоми, навіть після відпочинку, ні сила, ні енергія не відновлюються.

Емоційно індуковані захворювання (ЕІЗ) стають все більш поширеними і впливають на силу та енергію людини, особливо чоловіка, що в свою чергу на пряму пов'язане з його репродуктивністю. Поширені зараз психосоматичні фактори, викликають втому та стрес, що може привести до чоловічої імпотенції. Імпотенції в основному суб'єктивна і чоловік сам може назвати свій діагноз лікарю: у нього немає жодних органічних порушень, проте втома призвела до втрати потенції. Хоча консультування це добре, проте це ще не вся справа. Втома лікується, та це може і не привести до покращення. Усунення занепокоєння, тривоги є корисним, та не зніме проблему, оскільки основною причиною є недостатність сексуального досвіду. Як тільки втому вилікувана, повертається сексуальне збудження (головним чином в корі головного мозку), оскільки статеві залози прийшли в норму. Взагалі сексуальні розлади недовготривалі, та як тільки вони стають постійними, то говорять про їх хронічний стан. В той час як чоловік є репродуктивним, він все ще може бути причиною безпліддя через недостатню сексуальну активність. Або він може мати передчасну еякуляцію, що приводить до незадоволення обох партнерів. Такий чоловік повинен бути обстеженим в цілому, а не виділяти лише проблему імпотенції. Консультації, підви-

Документ представлений на другій національній конференції Індійської асоціації з вивчення захворювань, які передаються статевим шляхом, 4 грудня 1977 року, м. Мадрас. Т. XXI, № VI, вересень, 1978 копія

Журнал Медицина та Хірургія Нунгамбаккам, м. Мадрас-600034.

щення самовпевненості, з метою зменшити напруження є корисними: секс - це психічні та емоційні враження, а не просто фізичний акт. Втома, тривога, напруженість, страх, впливати на ерекцію. Утримання викликають гіперемію в області передміхурової залози, що є причиною передчасної еякуляції. Таким чином, все це повинно бути виправлено, адже гармонія між здоровим духом і здоровим тілом є необхідною. Здорове тіло та дух, а не втома, напруженість, страх і комплекси, необхідних не тільки для продовження роду, а й для отримання повного задоволення від сексу, який подарувала нам природа.

### ФОРТЕЖ:

Ми хотіли оцінити препарат, який лікує чоловіка в цілому, а не лише симптоми. В статевому акті задіяне все тіло як фізично, так і розумово, також підключені м'язова, нервова та ендокринна системи. У аюрведичній системі медицини лікування хвороби спрямоване на все тіло, про що свідчить теорія Трідоша, тому для цього дослідження був обраний препарат Фортеж (Аларсін).

**Фортеж містить:** лептаденія сітчаста – 56,5 мг., брейнія – 56 мг., макуна пекуча – 30 мг., шавлія – 15 мг., гінадропсис – 30 мг., женьшень індійський – 15 мг., гвоздика – 7,5 мг., перець довгий – 7,5 мг., аїр звичайний – 7,5 мг., перець чорний – 7,5 мг., імбир – 7,5 мг., перець Кубеба – 7,5 мг., римська ромашка – 7,5 мг., сантал білий – 7,5 мг., мускатник запашний – 7,5 мг.

Вказано, що це поєднання впливає на нейрогландулярну систему. Знижує гіперзбудливість вищих та нижчих центрів, що відповідають за сексуальну активність. Полегшує симптоми втоми, психічної та функціональної імпотенції, передчасної еякуляції, нічної полуюції, сперматореї, слабкого оргазму, і т.д. Це безпечний препарат без побічних ефектів і, оскільки він є негормональним, виключає ризики, властиві гормональним лікам. Передбачається, що Фортеж надає відчуття розслаблення і свіжості, яке відновлює впевненість в сексуальному житті.

**ALARSIN**

## МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ:

До даного дослідження були залучені чоловіки, що страждали на втоми, сексуальну слабкість і слабкий ор-газм, які були пацієнтами Центру захворювань, що пере-даються статевим шляхом (ЗПСШ), Лікарні Сафдарянґ та Клініки психосексуальних розладів Всеіндійського інсти-туту медичних наук, що у Нью Делі. Дослідження прово-дилось протягом 1976-77 років.

Зі 166 розпочатих випадків, 33 випадки не вдалося про-стежити протягом всього випробувального терміну, що становив 12 тижнів. Відповідно, остаточна оцінка резуль-татів була зроблена тільки для 133 випадків.

Регулярні дослідження крові, сечі, випорожнень та VDRL-тест на сифіліс були зроблені у всіх випадках, перш ніж почати лікування Фортежем. Дослідження сперми проводилися у чоловіків, чиї партнерки мали первинне безпліддя.

## ВІКОВІ ГРУПИ:

Найбільша Вікова Група становила 63,9% з віком від 21 до 30 років. Деталі наведено в Таблиці 1.

ТАБЛИЦЯ 1. Вікові Групи

Вікова Група	Кількість випадків	%
18-20 років	28	21.1%
21-30	85	63.9%
31-40	16	12.0%
41-46	4	3.0%
Всього	133	100.0%

## Природа чоловічих статевих розладів:

Найбільшими за кількістю були випадки передчасної ея-куляції, а саме 46 (34.6%). Також був один випадок олі-госпермії. Подробиці наведено в Таблиці 2.

ТАБЛИЦЯ 2.

Чоловічі статеві розлади в розрізі вікових груп

Статевий розлад	18-20	21-30	31-40	41-46	Всього	%
Порушення ерекції	1	23	4	-	28	21.1%
Полюції	12	12	-	-	24	18.0%
Передчасна еякуляція	1	33	9	3	46	34.6%
Мастурбація	5	3	-	-	8	6.0%
Сперматорея	8	6	-	-	14	10.5%
Функціональна імпотенція	1	7	3	1	12	9.0%
Олігоспермія	-	1	-	-	1	0.8%
Всього	28	85	16	4	133	100.0%
%	21.1%	63.9%	12.0%	3.0%		100.0%

## ФОРТЕЖ:

### Схема застосування та оцінка результатів

Фортеж приймався в дозах по дві таблетки, тричі на день, протягом як мінімум 4 тижнів і максимум протягом 12 тижнів. Оцінка проводилась в кінці кожних чотирьох тижнів. Пацієнтів, що відчували покращення, було пере-ведено на підтримуючу дозу у 2 таблетки двічі на день протягом 2-6 місяців для підвищення загального тону-су. Критерії оцінки приймалися за хороші, якщо скарги пов-ністю зникали протягом дванадцятитижневого періоду

або якщо відбувалось покращення на понад 70% , що стосується зменшення втоми, нервового напруження, комплексу страху і закріпив.

Результат оцінювався як помірний, якщо відзначалось задовільне поліпшення симптомів і у пацієнта була повністю відсутня втома, неспокій і напруженість і від-новлювалась довіра до статевих відносин. Незначним вважався результат, якщо відбувалось покращення, але незадовільне, як суб'єктивно, так і об'єктивно. Якщо не відбувалось жодних покращень, ставилась оцінка нуль.

## РЕЗУЛЬТАТИ:

Покращення було Хорошим в 71.4% випадків порушен-ня ерекції, 75% полюцій, 71.7% передчасних еякуляцій, 75.0% випадків мастурбації, 71.5% і та у 66.7% випадків функціональної імпотенції. В цілому, з 133 хворих 71,4% мали Хороше покращення, 12,0% - Помірне, 8,3% - Не-значне і 8,3% не мали жодних покращень. Подробиці на-ведено в Таблиці 3.

ТАБЛИЦЯ 3. Реакція на лікування Фортеж

Розлад	Кількість випадків	Добре	%	Помірне	%	Незначне	%	нуль	%
Порушення ерекції	28	20	71.4 %	4	14.3%	4	14.3%	-	
Полюції	24	18	75.0%	3	12.5%	2	8.3%	1	4.2%
Передчасна еякуляція	46	33	71.7%	5	10.9%	2	4.4%	6	13.0
Мастурбація	8	6	75.0%	1	12.5%	1	12.5%	-	
Сперматорея	14	10	71.5%	2	14.3%	1	3.1%	1	7.71
Функціона- льна імпотенція	12	8	66.7%	1	8.3%	1	8.3%	2	16.7
Олігоспермія	1	-				-		1	100%
Всього	133	95		4		11	11		
%	100.0%	71.4 %		12.0 %	8.3%			8.3 %	

## Розкриття проблеми

Втома є основним з факторів, що спричиняють статеві розлади серед чоловіків. Завдяки лікуванню препара-том Фортеж в цілому 71,4% пацієнтів показало хорошу реакцію. Більшості з них вдалось відчувти покращення за місяць терапії препаратом Фортеж. Було нараховано 8 ви-падків мастурбації серед чоловіків у віці 18-21 років, усі – неодружені. Їм було надано консультації. Їх також підба-дьорювали, кажучи, що мастурбація є природною і може бути необхідною для зняття сексуального напруження. Цим пацієнтам також рекомендували позбутися комплек-су провини чи фобії гріха через мастурбацію, натомість подолати свою фізичну чи розумову втому, і позбутися закріпив, якщо такі були. При терапії препаратом Фортеж у них зникли нервова напруга і комплекс страху, й відзна-чалось повне покращення в 6 з 8 пацієнтів.

Було встановлено один випадок олігоспермії. Це був ви-падок первинного безпліддя в парі, що стало відомо в результаті дослідження сперми. Хоча при повторному об-стеженні сперми було відзначено деяке поліпшення, воно не приймалось до уваги при оцінці, оскільки для цього по-трібна більш тривала терапія і тривалий період спостере-ження, що виходять за рамки даного дослідження.

Пацієнтам, що відвідували Клініку психосексуальних розладів, бракувало статевого виховання. Вони мали неправильне уявлення про сексуальність, що призводить до занепокоєння і напруженості. Належне консультування з сексуальних питань та терапія Фортеж допомогли досягти полегшення у більшості хворих з нашої групи.

Закрепи виявилися поширеними при проблемах передчасної еякуляцією, сперматореї та полюції. Вони також можуть стати причиною закупорки в районі простати, коли навіть найменше збудження може викликати сильне скорочення сім'яних залоз. Фортеж полегшив запори і зменшив втому, а також нервову напругу, і стан пацієнтів покращився. Він також дав їм відчуття свіжості, бадьорості та хорошого самопочуття.

В більшості випадків покращення спостерігалось протягом перших чотирьох тижнів. Партнерки пацієнтів також відзначали, що їхні чоловіки в кращій формі, ніж було раніше. Тим не менш, було помічено, що в перший місяць не досягається максимального покращення і подальша реакція на препарат уповільнюється.

У Фортеж не було відзначено седативної чи будь-якої іншої побічної дії, що доводить безпечність даного препарату.

## ВИСНОВКИ

Більшість пацієнтів (71.4%) відчула покращення поширених статевих розладів. Фортеж зняв стомлюваність, знизив гіперзбудливість і відновив втрачену впевненість в статевому житті. Запори було усунуто. У Фортеж не було виявлено жодних побічних ефектів і, будучи негормональним лікарським засобом, він виключає властиві гормональному лікуванню загрози для здоров'я.

Фортеж може розглядатися як корисний препарат для лікування загальних чоловічих статевих розладів, оскільки він є недорогим, ефективним і безпечним.

## ВИСНОВКИ

133 чоловіка з сексуальними розладами, які відвідували Навчально-Показовий Центр венеричних захворювань, Лікарню Сафдарджан ( Нью-Делі) та Лікарню Психостатевих Розладів, AIIMS, Нью-Делі, приймали Фортеж протягом 4-12 тижнів. Добрі відгуки були отримані в 71,4%, і більшість з них показали покращення уже протягом перших чотирьох тижнів терапії. При прийомі Фортежу ні токсичної дії, ні жодних побічних ефектів не спостерігалось.

## ПОДЯКА:

Висловлюємо подяку доктору Н.Л.Праманик, керуючому лікарнею Сафдарджан, Нью-Делі, і директору Всеіндійського інституту медичних наук, Нью-Делі, у проведенні даного дослідження. Ми вдячні фармацевтичній компанії АЛАРСІН, Бомбей, за їх співпрацю.

## ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Gupta, L. N. & Saluja, J. S.(1975): Role Fortege in Oligospermia: Current Med: Pract. Vol. 19, No: 6, pp.272-273, 1975.
2. Joshi, S. K. (1965) ~ Syndrome of Dhat in the male (use of an Ayurvedic Compound), Mah. Med. Jr. Dec. 1965:
3. Shelat, R. K., Majumdar, Muktiben Banderia, Bhartiben C. & Basu, K. N. (1977): Usefulness of Fortage in Oligospermia and low motility Sperms: I Asian Congress of Fertility & Sterility, Bombay, 19-23 Feb. 1977
4. Sukhtankar, V. R. (1960), A peculiar anxiety syndrome, night mare of millions: Indian Pract., Dec, 1960 .